懷孕期

文章

產前檢查時必須問、做的注意事項

孕媽媽對於產前檢查是否都有很多疑問？ 例如是否每次都要驗尿？增磅愈多愈好？媽媽有B型鏈球菌應怎麼辦？立即了解更多，做好準備令BB可以健康成長，媽媽您有得揀！

1 min to read

首次的產前檢查：

首次的產前檢查通常會被安排在十至十四周進行。首次檢查的時候，護士會問你一些個人資料，包括你個人和家人的健康狀況、過往的

□□□

□□
□□□

4. □□□□□

□□□□

晚發性的感染:

一般發生在嬰兒出生後一周或幾個月內

- 常見的症狀是腦膜炎

新生兒的晚發性感染不及早發性的常見。

我如何知道是否有乙型鏈球菌?

醫管局轄下的產前門診及衞生署的母嬰健康院可為合符資格的本港孕婦提供乙型鏈球菌拭子普及篩查。拭子篩查是在妊娠晚期約35-37周進行，篩查過程十分簡單、快捷，並不構成任何痛楚，只需採低陰道及直腸拭子樣本，然後送到化驗室進行培菌和敏感測試。因為乙型鏈球菌存在人體內的時間不定，故孕婦早期的樣本結果並不能反映生產時的狀況，因此在接近分娩期間，約35-37周妊娠晚期進行拭子測試最為準確。

若拭子測試樣本呈陽性，怎樣才可以預防孩子受到感染?

並不是每位有乙型鏈球菌寄存的母親的新生兒都會受到感染，新生兒的感染率約每100至200個乙型鏈球菌寄存的孕婦中，大概只有一個嬰兒會受到感染。

拭子測試呈陽性的孕婦，我們建議在你分娩時給你靜脈注射抗生素，可大大降低新生兒受到感染的機會。

有乙型鏈球菌寄存的孕婦，在分娩前服用抗生素是不能有效地消滅細菌，因為它常寄存在人體內，並會在抗生素療程後再復現，所以最有效預防新生兒感染的方法，是在分娩時接受抗生素靜脈注射。

每個孕媽媽體質和檢測需要各有不同，如有任何疑問，請咨詢醫護人員意見。

以上內容參考及節錄自衞生署家庭健康服務網頁，詳情請瀏覽:

http://www.fhs.gov.hk/tc_chi/mulit_med/000051.html

http://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/woman/30005.html

雀巢心得精華

做好產前敏感風險指數測試有助寶寶預防敏感

寶寶一旦出現敏感，繼而引發其他敏感症狀的機會較高，而且更往往伴隨成長。預防勝於治療，現在就進行測試，了解寶寶的敏感風險指數及如何減低風險。