

2HMOs

□□□□

2HMOs


- 100%乳清蛋白+結合獨特精準切割水解技術
- 2'FL LNNt HMOs

pHF-W

100%乳清蛋白+結合獨特精準切割水解技術
研究指雀巢®獨特水解技術處理的pHF-W乳清水解蛋白
可降低牛奶蛋白致敏性，同時易消化。

普通牛奶


致敏原



☹️ 大分子蛋白

雀巢®能恩®啟護® 2 配方奶粉

精準切斷致敏原



😊 100%乳清水解蛋白
降低致敏性

SCIENCE
for their amazing
FUTURES


從農場、生產至產品包裝方面都作出相應減排措施，支持地球可持續發展。

採用植物性塑料包裝

Join Nestlé to support sustainability by recycling packaging materials.

2HMO^{®^}

優選常見於媽媽天然授乳分泌中的2'FL及LNNt。研究顯示HMOs有助支持免疫力。



Good food, Good life

^2'FL LNNt HMO 100 39

◆Patent published as US 100 92 633.

66%

1. Bourdeau, t., et al. (2021) Nutrients, 13, 3011
2. Billeaud, C., et al. (1990) European Journal of Clinical Nutrition, 44(8), 577-583
3. Puccio, G., et al. (2017). Journal of Pediatric Gastroenterol Nutrition, 64(4), 624-31.

□□□□

NUTRITION INFORMATION 營養資料

		Per 100 g of Powder 每100克奶粉	Per 100 mL of Prepared Formula [△] 每100毫升沖調液 [△]
Energy 能量	kcal 千卡	490	67
Protein 蛋白質	g 克	14.7	2.01
Fat 脂肪	g 克	22.5	3.08
- Saturated fat 飽和脂肪	g 克	2.7	0.36
- Trans fat 反式脂肪	g 克	0	0
- ARA 花生四烯酸	mg 毫克	32	4.37
- DHA 二十二碳六烯酸	mg 毫克	32	4.37
- Linoleic acid 亞油酸	mg 毫克	4700	642
- α-Linolenic acid 亞麻酸	mg 毫克	740	101
Carbohydrates 碳水化合物	g 克	57.1	7.8
- Sugars 糖	g 克	57.1	7.8
- Lactose 乳糖	g 克	57.1	7.8
2'-O-Fucosyllactose 2'-岩藻糖基乳糖	mg 毫克	190	26
Lacto-N-neotetraose 乳糖-N-新四糖	mg 毫克	95	13
Bifidus 比菲德氏菌	cfu 菌落數	1x10 ⁸	1.4x10 ⁷
Minerals 礦物質	g 克	2.89	0.39
Sodium 鈉	mg 毫克	217	30
Potassium 鉀	mg 毫克	465	63.5
Calcium 鈣	mg 毫克	548	74.9
Phosphorus 磷	mg 毫克	300	41
Magnesium 鎂	mg 毫克	47	6.42
Iron 鐵	mg 毫克	5.8	0.79
Zinc 鋅	mg 毫克	3.4	0.46
Copper 銅	µg 微克	320	43.7
Chloride 氯化物	mg 毫克	408	55.8
Iodine 碘	µg 微克	49	6.7
Manganese 錳	µg 微克	52	7.11
Selenium 硒	µg 微克	9.5	1.3
Vitamin A 維他命 A	µg RE 視黃醇當量微克	458	62.6
Vitamin D 維他命 D	µg 微克	7.9	1.08
Vitamin E 維他命 E	mg α-TE α-生育酚當量毫克	6.8	0.93
Vitamin K 維他命 K	µg 微克	29	3.96
Vitamin C 維他命 C	mg 毫克	70	9.57
Vitamin B1 維他命 B1	µg 微克	370	50.6
Vitamin B2 維他命 B2	µg 微克	1100	150
Niacin 煙酸	mg 毫克	3.2	0.44
Vitamin B6 維他命 B6	µg 微克	310	42.4
Folic acid 葉酸	µg 微克	70	9.57
Vitamin B12 維他命 B12	µg 微克	0.8	0.11
Pantothenic acid 泛酸	mg 毫克	2.4	0.33
Biotin 生物素	µg 微克	9	1.23

1 Scoop = 4.56g powder; [△]100 mL prepared formula = 13.67 g of powder + 90 mL of water
 1平匙 = 4.56克奶粉; [△]100毫升沖調液 = 13.67克奶粉 + 90毫升水



5天轉奶參考表

	第1天	第2天	第3天	第4天	第5天
第1餐	✕ 其他配方	✕ 其他配方	✕ 其他配方	✕ 其他配方	
第2餐	✕ 其他配方	✕ 其他配方			
第3餐					
第4餐	✕ 其他配方	✕ 其他配方	✕ 其他配方		
第5餐	✕ 其他配方	✕ 其他配方	✕ 其他配方	✕ 其他配方	

備註：如果你不想完全轉用奶粉，請於達至您心目中認為合適的比例就停止轉換。
餐次、分量及轉換速度因人而異，以上建議只供參考。沖調時必須依照包裝上之沖調方法。
表格中的圖案代表雀巢®能恩®啟護™ 2號配方奶粉。



