□□□□□□□□□


雀巢 Nestlé
NAN PRO
能恩 啟護
2
pHF-W
乳清水解蛋白
2 HMO
淨重 800 g (克)
較大嬰兒配方奶粉
FOLLOW UP FORMULA POWDER
6至12個月適用
Suitable from
6 to 12 months old

□□®□□®□□®2□□□

6□12□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□♦)□□□□ 2HMOs^□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□®□□®□□®2□□□□□□□□pHF-W □□□□□□□□2HMOs^

- □□□□□®□□□□□□□□□□pHF-W□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[1]□□□□□□□[2]□
- □□□□□□□□□□□□□□□□2'FL □LNnT□□□□□HMOs□□□□□□□□[3]□



^2'FL□LNnT□□□HMO□□□□□□□□□ □□100□□□□□□39□□□

♦Patent published as US 100 92 633.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□66%□□□□□□

1. Bourdeau, t., et al. (2021) Nutrients, 13, 3011

2. Billeaud, C., et al. (1990) European Journal of Clinical Nutrition, 44(8), 577-583

3. Puccio, G., et al. (2017). Journal of Pediatric Gastroenterol Nutrition, 64(4), 624-31.

□□□□

NUTRITION INFORMATION 營養資料

		Per 100 g of Powder 每100克奶粉	Per 100 mL of Prepared Formula△ 每100毫升沖調液△
Energy 能量	kcal 千卡	490	67
Protein 蛋白質	g 克	14.7	2.01
Fat 脂肪	g 克	22.5	3.08
- Saturated fat 飽和脂肪	g 克	2.7	0.36
- Trans fat 反式脂肪	g 克	0	0
- ARA 花生四烯酸	mg 毫克	32	4.37
- DHA 二十二碳六烯酸	mg 毫克	32	4.37
- Linoleic acid 亞油酸	mg 毫克	4700	642
- α - Linolenic acid 亞麻酸	mg 毫克	740	101
Carbohydrates 碳水化合物	g 克	57.1	7.8
- Sugars糖	g 克	57.1	7.8
- Lactose 乳糖	g 克	57.1	7.8
2'-O- Fucosyllactose 2'-岩藻糖基乳糖	mg 毫克	190	26
Lacto-N-neotetraose 乳糖-N-新四糖	mg 毫克	95	13
Bifidus 比菲德氏菌	cfu 菌落數	1x10^8	1.4x10^7
Minerals 礦物質	g 克	2.89	0.39
Sodium 鈉	mg 毫克	217	30
Potassium 鉀	mg 毫克	465	63.5
Calcium 鈣	mg 毫克	548	74.9
Phosphorus 磷	mg 毫克	300	41
Magnesium 鎂	mg 毫克	47	6.42
Iron 鐵	mg 毫克	5.8	0.79
Zinc 鋅	mg 毫克	3.4	0.46
Copper 銅	μg 微克	320	43.7
Chloride 氯化物	mg 毫克	408	55.8
Iodine 碘	μg 微克	49	6.7
Manganese 錳	μg 微克	52	7.11
Selenium 硒	μg 微克	9.5	1.3
Vitamin A 維他命 A	μg RE 視黃醇當量微克	458	62.6
Vitamin D 維他命 D	μg 微克	7.9	1.08
Vitamin E 維他命 E	mg α-TE α-生育酚當量毫克	6.8	0.93
Vitamin K 維他命 K	μg 微克	29	3.96
Vitamin C 維他命 C	mg 毫克	70	9.57
Vitamin B1 維他命 B1	μg 微克	370	50.6
Vitamin B2 維他命 B2	μg 微克	1100	150
Niacin 煙酸	mg 毫克	3.2	0.44
Vitamin B6 維他命 B6	μg 微克	310	42.4
Folic acid 葉酸	μg 微克	70	9.57
Vitamin B12 維他命 B12	μg 微克	0.8	0.11
Pantothenic acid 泛酸	mg 毫克	2.4	0.33
Biotin 生物素	μg 微克	9	1.23

1 Scoop = 4.56g powder; △100 mL prepared formula = 13.67 g of powder + 90 mL of water
1平匙 = 4.56克奶粉; △100毫升沖調液 = 13.67克奶粉 + 90毫升水

□□□□


NAN PRO
能恩 啟護
2
5天轉奶參考表
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第1餐
第2餐
第3餐
第4餐
第5餐
其他配方
備註：如果你不想完全轉用奶粉，請於達至您心目中認為合適的比例就停止轉換。
餐次、分量及轉換速度因人而異，以上建議只供參考。沖調時必須依照包裝上之沖調方法。
表格中的圖案代表雀巢® 能恩® 啟護™ 2號配方奶粉。

□□□□



^2'FL□LNnT□□□HMO□□□□□□□□ □□100□□□□□□39□□□

♦Patent published as US 100 92 633.

□□□□: □□□□□□□□□